

**ОТВОРЕНО 3-МЕСЕЧНО
ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЕОМЕНОР
ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ДИСМЕНОРЕЯ**

*Д-р Михайлов,
VI^{-то} ДКЦ,
III^{-та} градска болница*

ДИЗАЙН НА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО

- Отворено проследяване на пациентки с първична дисменорея.
- Ретроспективно проследяване на предходната терапия и нейната ефективност, както и основните съпътстващи симптоми на дисменорея.
- 3 месечен прием на **NEOMENOR** по схема и ежемесечно отчитане на овладяването на болковия синдром и съпътстващите симптоми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЦИЕНТКИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОСЛЕДЯВАНЕТО


Общ брой пациентки	Средна възраст	Средна възраст при менархе	Първична дисменорея
n=13	22.8 ± 6 години	12.96 ± 1	92% (12 от 13)

- 1 пациентка с нередовна менструация.
- 1 пациентка след лечение на киста на десен яйчник.


ОСНОВНИ СЪПЪТСТВАЩИ СИМПТОМИ ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ С НЕОМЕНОР:

Гагене, Главоболуе и Коланс


Разпределение на съпътстващите симптоми




Разпределение на пациентките според броя на съпътстващите симптоми




ТЕРАПИЯ ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ С НЕОМЕНОР



РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДХОДНА ТЕРАПИЯ



РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕРАПИЯТА С НЕОМЕНОР



ИЗВОДИ

- Лечението с **NEOMENOR** при пациентки с първична дисменорея води до овладяване на болковия синдром и съпътстващите симптоми.
- Ефекта от лечението при болшинството от пациентките настъпва още през първия месец (92.45).
- На 3-ти месец от приема на **NEOMENOR**, всички пациентки са без симптоми
- Наблюдава се нормализиране на менструалния цикъл при пациентката с нередовна менструация. Менструацията настъпва на 28-29-ти ден.

**БЛАГОДАРЯ ЗА
ТЪРПЕНИЕТО !**