



Неоменор

Ефективност за целия спектър
от симптоми при дисменорея

NEOMENOR. Ефективност за целия спектър от симптоми при дисменорея

Дисменореята е сериозен социален и икономически проблем, като честотата ѝ варира между 45 и 90% според различните проучвания.

При първичната **дисменорея** най-често липсва органична причина.

- ▶ Началото ѝ е средно 6 до 12 месеца след менархето.
- ▶ За основен патофизиологичен механизъм за нейната поява се счита силното увеличение на нивата на простагландините, които предизвикват исхемия на матката чрез маточна контракция и вазоконстрикция.
- ▶ Изследванията показват, че жени с тежка дисменорея имат до 13 пъти по-високи нива на простагландини F2 и E2 в менструалната кръв.


NEOMENOR: Състав и биологично активни вещества в 1 таблетка

БИОЛОГИЧНО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО В 1 ТАБЛЕТКА
Флавоноиди	10,05 mg
Монозахариди и полизахариди	24,75 mg
Танини	5,00 mg
Галова киселина	1,00 mg
Тритерпенови сапонини	34,50 mg
Стероли	12,50 mg
Стероидни терпеноиди	5,50 mg

Всяка таблетка Neomenor съдържа 400 mg стандартизирани екстракти от:

- ▶ *Astragalus glycyphyllos* – 260 mg
- ▶ *Erodium cicutarium* – 70 mg
- ▶ *Geranium sanguineum* – 70 mg

Биологично действие на основните активни вещества в състава на NEOMENOR



Действията на активните вещества в състава на NEOMENOR осигуряват:

- ▶ Инхибиране на синтеза и секрецията на простагландини и интерлевкин 1β (IL-1β)
- ▶ Прогестероноподобно действие и модулиране на нервно-ендокринната функция
- ▶ Подтискане на контрактилитета на гладката мускулатура

NEOMENOR. Механизми на действие при дисменорея



NEOMENOR инхибира синтеза и секрецията на простагландини

▶ Полизахаридите в състава на NEOMENOR:


- блокират интерлевкин – 1β рецепторът в мускулите на матката, което води до инхибиране на секрецията на простагландини;
- инхибират секрецията на интерлевкин – 1β (IL-1β), което води до допълнително подтискане на синтеза на простагландини.

▶ Флавоноидите в състава на NEOMENOR:

- инхибират ензима PGH – синтаза от цикъла на арахидоновата киселина и блокират синтеза на простагландини;
- стимулират синтеза на интерлевкин – 10 (IL-10), което инхибира секрецията на проинфламаторни цитокини в това число простагландини.

NEOMENOR притежава прогестероноподобно действие и модулира нервно-ендокринната функция

- ▶ Тритерпеноидните гликозиди, сапонините и стеролите в състава на NEOMENOR са сходни по структура на прекурсорите на стероидните хормони и притежават леко прогестероноподобно действие.
- ▶ Блокирането на синтеза и секрецията на интерлевкин – 1β, води до инхибиране на секрецията на хормони от хипофизата.



NEOMENOR подтиска контрактилитета на гладката мускулатура

- ▶ Инхибирането на синтеза и секрецията на простагландини от NEOMENOR води до подтискане на контрактилитета на гладката мускулатура на матката. Доказано е, че простагландините PGE и PGF имат мощен ефект върху контрактилитета на гладката мускулатура.
- ▶ Блокирането на синтеза и секрецията на интерлевкин – 1β, води до инхибиране на секрецията на окситоцин и кортизол, които потискат контрактилитета на матката.

NEOMENOR. Ефективност за целия спектър от симптоми при дисменорея

NEOMENOR повлиява причините предизвикващи дисменорея

- ▶ NEOMENOR овладява болковия синдром като инхибира синтеза и секрецията на простагландини.
- ▶ NEOMENOR подтиска контрактилитета на гладките мускули в матката и намалява спазмите и контракциите.
- ▶ NEOMENOR притежава прогестероноподобно действие и модулира нервнo-ендокринната функция.
- ▶ NEOMENOR възстановява и регулира хормоналния баланс.
- ▶ NEOMENOR намалява нервното напрежение преди и по време на менструалния цикъл.
- ▶ NEOMENOR позволява дългосрочно приложение без проява на странични ефекти.
- ▶ NEOMENOR няма противопоказания за употреба.
- ▶ NEOMENOR притежава удобен режим на прием – 2 пъти дневно.

NEOMENOR се препоръчва при:

- ▶ Първична дисменорея
- ▶ Менструални крампи / спазми
- ▶ Менструална мигрена

Режим на гозиране на NEOMENOR

ИНДИКАЦИЯ	ДНЕВНА ДОЗА	СХЕМА НА ПРИЕМ	МИНИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЕМА
<ul style="list-style-type: none">• Първична дисменорея;• Менструални спазми/ крампи;• Менструална мигрена	2 пъти по 1 таблетка	Приемът започва 10 дни преди началото на менструалния цикъл и продължава 20 дни.	3 последователни менструални цикъла

Когато менструалния цикъл е нередовен и не може да се определи началото му, приемът на NEOMENOR започва на десетия ден след началото на менструацията.

